ВТОРОЕ НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ, 16 января 2000 года.

Внешнее магнитное поле тороидальных токовых структур (торов) с полоидальным электрическим током.

О циркуляции и реальном поле



Рис. 1



Рис. 2

Хотя циркуляция **H** по контуру *L*, не охватывающему источник поля **I**, равна нулю, но **H**≠0 (Рис.1). Однако в классической теории электромагнетизма, применительно к торам, утверждается, что если контур *Ct* не охватывает токов, то циркуляция по нему равна нулю (Рис.2) и, следовательно **H**≡0, что противоречит эксперименту из-за подмены причинно-следственной связи – поле определяет циркуляцию, а не циркуляция определяет поле ($\mathbf{H}=0 \Rightarrow C=0 \vee C=0 \not\Rightarrow \mathbf{H}=0$). Это то же самое, что утверждать, что если циркуляция по контуру *L*, не охватывающему источник поля **I** (Рис. 1), равна нулю, то у прямого тока **I H**≡0, что противоречит реальности ($\mathbf{H} \neq 0\big|_{C\equiv 0}$)

http://ens.tpu.ru/POSOBIE_FIS_KUSN/электромагнетизм/02-8.htm

https://helpiks.org/4-59637.html

https://bstudy.net/743523/estestvoznanie/magnitnoe_pole_solenoida_toroida

https://studref.com/535898/matematika_himiya_fizik/magnitnoe_pole_toroida

Впоследствии это стало догмой, которую мне удалось экспериментально и теоретически преодолеть для торов.

Это и есть большое научное открытие с далеко идущими последствиями (новая глобальная энергетика, освоение ближнего и дальнего Космоса *[V=0.1C]*).

Евгений Александрович Григорьев, http://thermonuclear.ru 03 сентября 2021 г.